



## **DRAINAGE VAN VOCHTHOLTE/ABCES**

## DEFINITIE

Onder echografische of CT-grafische controle wordt een buisje (drain) in een vochtholte of abces geplaatst. Deze zal de vochtholte/ het abces zo veel mogelijk leegmaken (draineren).

De procedure kan ook worden verricht om een ontstoken galblaas 'af te laten koelen'.

Het buisje blijft meestal ter plaatse en zal worden verwijderd door de behandelende arts.

## VOORBEREIDING

Het onderzoek wordt meestal nuchter verricht.

Deze ingreep wordt enkel uitgevoerd na overleg met de aanvragende arts en in combinatie met een (kortdurende) opname.

Bloedverdunnende medicatie dient te worden vermeden en meestal tijdelijk te worden aangepast door de aanvragende arts.

De bloedstolling wordt op voorhand nagekeken door de verwijzende arts door middel van een bloedname.

## VERLOOP ONDERZOEK

- Afhankelijk van de onderzoekstechniek wordt het onderzoek uitgevoerd op de CT tafel of in bed.
- Het lichaam wordt ontbloot ter hoogte van de vochtholte/abces.
- Het letsel wordt gelokaliseerd en een aanprikplaats wordt bepaald.
- De aanprikplaats wordt lokaal ontsmet en verdoofd en er wordt een klein sneetje in de huid gemaakt.
- De katheter wordt ingebracht door middel van een naald onder continue echografische of CT-grafische controle. Het buisje wordt opgekruld in de holte en vastgemaakt aan het huidoppervlak zodat deze stevig vastzit en wordt verbonden met een vochtzakje.
- Vaak zal een staal genomen worden voor microbiologisch (bacteriën of virussen) en/of cytologisch (cel) onderzoek.

## NAZORG

Het kathetersysteem zal regelmatig worden gespoeld en het vochtzakje geledigd of vervangen.

**Bij koorts en/of huidirritatie** dient u zo spoedig mogelijk contact te nemen met de aanvragende arts of dienst spoedgevallen.

De behandelende arts zal het buisje verwijderen wanneer nodig.