



SCHILDKLIER- PUNCTIE

DEFINITIE

Onder echografische controle wordt een cyste of vastweefsel letsel in de schildklier aangeprikt. Dit voor het bekomen van een cystologische (cel) diagnose uitgevoerd door de anatomopatholoog onder een microscoop.

VOORBEREIDING

Geen bijzondere voorbereiding vereist. Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak.

U dient best de voorgaande onderzoeken mee te brengen dewelke tot deze beslissing leidden, indien deze niet bij onze dienst werden verricht.

VERLOOP ONDERZOEK

- Er wordt gevraagd de hals goed vrij te maken, liefst door het ontbloten van het bovenlichaam. Ondergoed mag aangehouden worden.
- Nadien neemt u plaats op de onderzoekstafel.
- Er wordt een klassieke echografie verricht voor het lokaliseren van het letsel en bepalen van de aanprikplaats.
- De aanprikplaats wordt lokaal ontsmet.
- Door middel van een zeer fijne naald worden enkel cellen vanuit het letsel opgezogen via de naald na het aanprikken van het letsel. De naald zal even heen en weer geschoven worden om een goed staal te bekomen.
- U dient tijdens het uitvoeren van bovenstaande procedure goed stil te liggen en niet te slikken.
- De cellen worden in het laboratorium door de anatomopatholoog verder onderzocht.
- De aanvragende arts zal de resultaten in principe tot zijn beschikking hebben binnen de 5 werkdagen.

NAZORG

De punctieplaats wordt even afgedrukt om de blauwe plek zo veel mogelijk te voorkomen, doch is een normaal verschijnsel.

Er wordt een eventueel een pleister aangebracht op de punctieplaats, dewelke na 1-2 dagen kan worden verwijderd.