



RX PERITONEOGRAFIE

DEFINITIE

Bij een peritoneografie worden röntgenfoto's van de buikholte gemaakt. Voorafgaand aan de foto's wordt een fijne naald via de buikwand tot in de buikvliesholte (peritoneum) geplaatst, waarlangs contrastvloeistof wordt ingespoten.

INDICATIES

Dit onderzoek dient om breukjes (hernia) van het buikvlies (bvb in het lieskanaal of buikwand) op te sporen.

VOORBEREIDING

U moet **minstens vier uur nuchter zijn** vóór het onderzoek (d.w.z. niet eten, drinken of roken).

's Morgens mag één slok water gedronken worden bij inname van medicatie.

Vraag steeds advies aan uw arts voor **inname van uw dagelijkse medicatie**. Sommige medicatie kan schadelijk zijn voor de nierfunctie.

Maak vooraf steeds een **melding bij uw arts** indien u (mogelijk) zwanger bent, een contrastallergie hebt (jodium), (mogelijk) nierfunctiestoornissen heeft en/of aan diabetes lijdt (in het bijzonder medicatiegebruik met Metformine®).

VERLOOP ONDERZOEK

- U mag enkel ondergoed aanhouden tijdens het onderzoek.
- U wordt in rugligging op de tafel gepositioneerd.
- De insteekplaats thv uw onderbuik wordt grondig ontsmet en verdoofd.
- De radioloog prikt met een lange fijne naald in de onderbuik tot in de buikvliesholte. Via deze naald wordt een contraststof ingespoten. Vervolgens wordt de naald weer verwijderd.
- Nadien worden er foto's gemaakt in buikligging na verspreiden van de contraststof.
- Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

NAZORG

Het is aangewezen voldoende water te drinken na het onderzoek zodat de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam verdwijnt.

U mag die dag geen zware inspanningen verrichten.