



**RX**  
**SLIKFUNCTIE**

## DEFINITIE

Bij een slikfunctie worden röntgenfoto's van de keel en bovenste slokdarm gemaakt. Dit door middel van het doorslikken van een vloeibare (of soms vaste) contrastbolus.

## INDICATIES

Opsporen van slikafwijkingen (bvb verslikken) of anatomische afwijkingen. Eventuele ingeslikte of vastzittende voorwerpen aantonen.

## VOORBEREIDING

U moet **niet nuchter** zijn. Meld steeds aan de verpleegkundige indien u zich **verslikt**. Maak vooraf steeds een **melding bij uw arts** indien u (mogelijk) zwanger bent of een contrastallergie hebt (jodium).

## VERLOOP ONDERZOEK

- De hals wordt goed ontbloot.
- Ook halsketting, oorbellen of tandprothesen worden verwijderd.
- U neemt plaats in zittende houding op het bankje van de onderzoekstafel.
- U neemt een slok contrastmiddel en slikt deze door wanneer de radioloog u hierom verzoekt en probeert hierbij het hoofd zo goed mogelijk stil te houden. Deze procedure wordt enkele malen herhaald.
- Duur: ongeveer 10 minuten.

## NAZORG

De stoelgang heeft enkele dagen nadien een witte kleur, afhankelijk van het gebruikte contrastmiddel. Soms kan het contrastmiddel (barium) constipatie veroorzaken. Het is aangewezen voldoende water te drinken na het onderzoek zodat de contrastvloeistof sneller uit uw maagdarmsstelsel verdwijnt.