



**RX
TRANSIT**

DEFINITIE

Bij een enterografie worden röntgenfoto's van de slokdarm, maag en dunne darm verricht. Dit door middel van het doorslikken van een vloeibare contrastbolus (meestal barium).

INDICATIES

Opsporen van afwijkingen van de dundarm. Snelheid van transit van het contrast door de dunne darm.

VOORBEREIDING

U moet **minstens vier uur nuchter zijn** vóór het onderzoek (d.w.z. niet eten, drinken of roken).

's Morgens mag één slok water gedronken worden bij inname van medicatie.

Maak vooraf steeds een **melding bij uw arts** indien u (mogelijk) zwanger bent of een contrastallergie hebt (jodium).

VERLOOP ONDERZOEK

- U moet zich uitkleden, met uitzondering van de slip, en er wordt u een operatieschortje aangeboden.
- U neemt een staande houding aan op het bankje van de onderzoekstafel.
- U neemt een slok contrastmiddel en slikt deze door wanneer de radioloog u hierom verzoekt en probeert hierbij zo goed mogelijk stil te staan. Nadien drinkt u nog contrastmiddel.
- Nadien worden ook enkele opnames in liggende houding, eventueel met compressie, uitgevoerd.
- Duur: minstens 1-2 uur, afhankelijk van de snelheid van het vullen met contrastmiddel van het laatste stukje dunne darm.

NAZORG

De stoelgang heeft enkele dagen nadien een witte kleur, afhankelijk van het gebruikte contrastmiddel. Soms kan het contrastmiddel (barium) constipatie veroorzaken.

Het is aangewezen voldoende water te drinken na het onderzoek zodat de contrastvloeistof sneller uit uw maagdarmsstelsel verdwijnt.